

អ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវការចង់ដឹង ដើម្បីរក្សាឱ្យមានសុវត្ថិភាព

ជម្ងឺ HIV និងមេរោគឯទៀតអាចប៉ះពាល់ដល់
មនុស្សទាំងអស់ ទោះជាថាគេមកពី
ប្រទេស ឬតំបន់ណាក្តី។ កាលណាលោកអ្នក
បានដឹងច្រើនអំពីមេរោគទាំងនេះ
នោះលោកអ្នក អាចការពារ ខ្លួនលោកអ្នក
និងមនុស្សឯទៀត បានកាន់តែច្រើនផងដែរ។



ព័ត៌មានច្រើនថែមទៀត

កិច្ចប្រជុំផ្គត់ផ្គង់ និងសុខភាពពហុវប្បធម៌ (MHSS)
គឺជាកិច្ចប្រជុំវិភាគគិតថ្លៃ ហើយរក្សាទុកជាសម្ងាត់ សំរាប់អស់អ្នក
ដែលមានប្រវត្តិជាជនប្រវេសន៍ និងជនភៀសខ្លួន។

យើងអាចជួយបានដោយ:

- ឆ្លើយនូវសំណួរណាមួយដែលលោកអ្នកអាចមាន
- ទៅជាមួយលោកអ្នកដើម្បីទៅធ្វើតេស្តរកមេរោគ
- ជួយលោកអ្នក និងគ្រួសាររបស់លោកអ្នករក្សាសុវត្ថិភាព
ហើយមានសុខភាពល្អ

បុគ្គលិកសហគមន៍របស់យើងអាចនិយាយមកកាន់លោកអ្នកតាម
ទូរស័ព្ទ ឬមកជួបលោកអ្នកផ្ទាល់។ លោកអ្នកអាចនិយាយទៅ
កាន់បុគ្គលិកប្រុស ឬស្រី
ទៅតាមការជ្រើសរើសរបស់លោកអ្នក។

សូមទូរស័ព្ទមកយើង ឬបើកមើលវិបសាយរបស់យើងដើម្បីទទួល
យកព័ត៌មានបន្ថែម។

កិច្ចប្រជុំផ្គត់ផ្គង់ និងសុខភាពពហុវប្បធម៌
(03) 9342 9725 | enquiries@ceh.org.au

www.ceh.org.au/mhss.aspx

HIV គឺជាកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសំរាប់វប្បធម៌ សង្គមសាសន៍ និងសុខភាព។
ការចុះផ្សាយនេះបានទទួលការឧបត្ថម្ភថវិកាពី ក្រសួង ឯកិច្ចប្រជាជន។
រូបភាពគូសដោយ Thidang Chhor.



ឱ្យបានជ្រាបច្បាស់ ឱ្យមានសុវត្ថិភាព ឱ្យមានសុខភាពល្អ

ជម្ងឺ HIV | រោគរលាកថ្លើម | ជម្ងឺ STI



multicultural health
& support service

KHMER

តើជំងឺ HIV/AIDS ជាអ្វី ?

មនុស្សម្នាក់ៗមានប្រព័ន្ធស៊ីនេជំងឺ ដើម្បីរក្សាខ្លួនរបស់គេឱ្យមានសុខភាពល្អ ហើយប្រឆាំងទប់ទល់នឹងមេរោគ។ **រោគកង្វះភាពស៊ីនេជំងឺក្នុងខ្លួនប្រព័ន្ធស៊ីនេជំងឺ (HIV)** វាយលុកប្រព័ន្ធស៊ីនេជំងឺ។ **សហនិមិត្តហេតុនៃការមានរោគកង្វះភាពស៊ីនេជំងឺ (AIDS)** គឺជាក្រុមនៃជំងឺដែលកើតមានពេលណាប្រព័ន្ធស៊ីនេជំងឺវាអន់ខ្សោយបណ្តាលមកពីជំងឺ HIV.

ជំងឺ HIV ឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ ទៅមនុស្សម្នាក់តាមរយៈវត្ថុរាវនៃដងខ្លួន និងឈាម។ វិធីខ្លះទៀតដែលមនុស្សអាចឆ្លងជំងឺ HIV គឺមកពី៖

- ការរួមភេទដែលពុំមានប្រើប្រដាប់ការពារ (ការរួមភេទពុំមានស្រោមអនាម័យ)
- ការប្រើមូលចាក់រួមគ្នា នៅពេលចាក់គ្រឿងញៀន
- ម្តាយ ទៅកូននៅពេលសំរាលកូន ឬនៅពេលបំភ្លេន។

លោកអ្នកអាចឆ្លងជំងឺ HIV តាមរយៈការចៀប មូសខាំ ឬប្រើធានសម ស្លាបព្រា ឬឆ្នាំងរួមគ្នា ឬពិសាម្លូបអាហាររួមគ្នា។

តើរោគចម្លងនៅពេលរួមភេទជាអ្វី ?

រោគចម្លងនៅពេលរួមភេទ (STI) ឆ្លងពីជនម្នាក់ ទៅជនម្នាក់ទៀតក្នុងពេលរួមភេទ ការរួមភេទតាមមាត់ ឬពេលខ្លះតាមរយៈការទាក់ទងជាមួយប្រដាប់បន្តពូជ។ ប្រសិនបើមិនបានព្យាបាលទេ វាអាចនាំឱ្យកើតការក្រហាយរលាក ហើយឈឺចាប់ ព្រមទាំងនាំឱ្យមានការវិបាកសំរាប់បុរស និងស្ត្រីឱ្យមានកូនទៀតផង។

រោគសញ្ញានៃជំងឺ STI មានរួមទាំង៖

- ដំបៅ ពងរមាស់ ឬក្រហាយរលាកនៅកន្លែងប្រដាប់បន្តពូជ
- បញ្ចេញវត្ថុរាវខុសពីធម្មតាតាមលិង្គ ឬយានី
- ឈឺចាប់នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃពោះ ឬពងលិង្គ (បុរស)
- ឈឺចាប់ខុសពីធម្មតា ឬចេញឈាមបន្ទាប់ពីការរួមភេទ (ស្ត្រី)

ជួនកាល ជនណាម្នាក់អាចមានជំងឺ STI ក៏ប៉ុន្តែមិនបង្ហាញឱ្យឃើញរោគសញ្ញាទាល់តែសោះ។

តើរោគរលាកថ្លើមជាអ្វី ?

រោគរលាកថ្លើម គឺជាមេរោគដែលអាចធ្វើឱ្យខូចខាតដល់ថ្លើម។ មានប្រភេទនៃរោគរលាកថ្លើមខុសៗគ្នា ក៏ប៉ុន្តែគ្រប់ទាំងប្រភេទនៃជំងឺទាំងអស់អាចបណ្តាលឱ្យកើតជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ប្រសិនបើមិនបានព្យាបាលវាទេ។ **រោគរលាកថ្លើមប្រភេទអេ** ឆ្លងតាមរយៈម្តូបអាហារ ឬទឹកកខ្វក់។

រោគរលាកថ្លើមប្រភេទបី ឆ្លងតាមរយៈការរួមភេទ ឈាមមានមេរោគ ឬឆ្លងពីម្តាយទៅកូននៅពេលសំរាលកូន។

រោគរលាកថ្លើមប្រភេទសី ឆ្លងតាមរយៈឈាមមានមេរោគ ឧទាហរណ៍ ដោយសារការប្រើមូលចាក់គ្រឿងញៀនរួមគ្នា ឱ្យកាមរោម ច្រាសដុះឆ្មេញ ឬគ្រឿងប្រដាប់ចាក់សាក់ និងចោះស្បែកដងខ្លួន។

លោកអ្នកអាចទទួលបានការចាក់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងរោគរលាកថ្លើមប្រភេទអេ និងប្រភេទបី ក៏ប៉ុន្តែពុំមានថ្នាំចាក់ការពាររោគរលាកថ្លើម ប្រភេទសីឡើយ។



តើខ្ញុំអាចការពារខ្លួនខ្ញុំដោយរបៀបណា ?

មានវិធីងាយស្រួលមួយចំនួន ដើម្បីការពារខ្លួនលោកអ្នក និងអ្នកដទៃទៀតឱ្យបានរួចផុតពីការឆ្លងនៃជំងឺ។

- កុំរួមភេទ (ឱ្យមានការអត់ទ្រាំ) គឺជាវិធីមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេ ដើម្បីការពារខ្លួនលោកអ្នកពីជំងឺ HIV និង STI ក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនតែងតែធ្វើកើតជានិច្ចជាកាលនោះឡើយ។
- ប្រសិនបើលោកអ្នករួមភេទ ត្រូវប្រើស្រោមអនាម័យឱ្យបានគ្រប់ពេល។ ស្រោមអនាម័យគឺជាប្រដាប់ជួយការពារដែលគ្របការពារលិង្គ ហើយរក្សាការពារកុំឱ្យវត្ថុរាវឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ ទៅដល់មនុស្សម្នាក់ទៀត។ ស្រោមអនាម័យជួយការពារលោកអ្នកពីជំងឺ HIV រោគរលាកថ្លើមប្រភេទបី និងជំងឺ STI ភាគច្រើន។
- កុំប្រើមូលចាក់គ្រឿងញៀនរួមគ្នា គ្រឿងប្រដាប់ចាក់សាក់ដងខ្លួន ឬរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនដទៃទៀតជាមួយអ្នកផ្សេងទៀត។ ការនេះនឹងជួយការពារលោកអ្នកពី រោគរលាកថ្លើមប្រភេទបី ប្រភេទសី និងជំងឺ HIV។

តើខ្ញុំគួរទទួលបានការធ្វើតេស្តឬទេ ?

ប្រសិនបើលោកអ្នកគិតថា លោកអ្នកប្រហែលជាមានរោគឆ្លងមានកន្លែងជាច្រើនដែលលោកអ្នកអាចទទួលបានការធ្វើតេស្ត។ តេស្តសំរាប់ជំងឺ HIV រោគរលាកថ្លើម និងជំងឺ STI គឺងាយស្រួលធ្វើទេ មិនឈឺចាប់ឡើយ ហើយឥតគិតថ្លៃ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានរោគឆ្លង ពេលណាលោកអ្នកធ្វើតេស្ត លោកអ្នកអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានការព្យាបាល ហើយបញ្ឈប់លោកអ្នកពីការចម្លងទៅអ្នកដទៃទៀត។

